

Podstawowe pojęcia chemiczne

- atom
- cząsteczka
- liczba Avogadro
- masa atomowa i cząsteczkowa
- mol i masa molowa
- gramorównoważnik
- stężenie



%. skład ludzkiego ciała


H	O	C	Na	Ca	P	Cl
63%	25,5%	9,5%	1,4%	0,31%	0,22%	0,08%

%. skład skorupy ziemskiej

O	Si	Al	Fe	Ca	Na	K
47%	28%	7,9%	4,5%	3,5%	2,5%	2,5%

118 pierwiastków
92 w postaci naturalnej
Symbol –
1 lub 2 litery – nazwy
łacińskiej/angielskiej

2



3

pierwiastek chemiczny - w opisie makroskopowym substancja, która nie ulega rozkładowi podczas reakcji chemicznych; w opisie mikroskopowym zbiór atomów o takich samych właściwościach.

pierwiastek chemiczny, substancja prosta stanowiąca zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej. Atomy danego pierwiastka chemicznego mogą się różnić liczbą neutronów, a zatem i masą jądra.

cząsteczka - najmniejsza porcja związku chemicznego

atom - najmniejsza porcja pierwiastka chemicznego, każdy pierwiastek to zbiór określonych atomów

atomowa jednostka masy - (symbol u) jednostka masy używana do wyrażania mas drobin, na przykład atomów, cząsteczek

4

Atom

Najmniejsza ilość substancji prostej, czyli pierwiastka chemicznego, jaka może uczestniczyć w reakcjach chemicznych.

Liczbę dodatnich ładunków elementarnych (protonów) oraz ładunków ujemnych (elektronów) określa liczba atomowa (LA), zbiór atomów o jednakowej LA stanowi określony pierwiastek chemiczny.

Atomy danego pierwiastka mogą się różnić między sobą liczbą neutronów, a tym samym masą. Liczba, która określa sumę protonów i neutronów (nukleonów) w jądrze atomu nazywa się liczbą masową.



cząstki elementarne występujące w atomach

Cząstka	Symbol	Masa[u] j.a.m	Ładunek $1,6 \cdot 10^{-19}C$	Liczba
Proton	p	1,0073u $1,673 \cdot 10^{-24}g$	+1	Z
Neutron	n	1,0087u $1,675 \cdot 10^{-24}g$	0	N $N=A-Z$
Elektron	e	0,00055 $9,110 \cdot 10^{-28}g$	-1	Z

Z = liczba atomowa = ilość protonów lub elektronów w atomie
zapis : ${}_8O$, ${}_6C$,

A = liczba masowa

N = liczba neutronów

$$A=N+Z$$

6

- elektron
- proton
- neutron

jądro atomu

Jaki to pierwiastek?

7

Możliwa lokalizacja elektronów

8

Izotopy – atomy mają tę samą liczbę protonów i różną neutronów.

- elektron
- proton
- neutron

Jaki to pierwiastek? Ile ma izotopów? Jak nazywają się jego izotopy?

9

¹²₆C Carbon

przykład informacji o pierwiastku

$$\frac{A}{Z}X$$

azot wapń węgiel

$$\frac{14}{7}N$$

$$\frac{40}{20}Ca$$

$$\frac{12}{6}C$$

⁵⁶₂₆Fe można wyrazić jako Fe-56

10

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

uporządkowany zbiór wszystkich znanych pierwiastków

prawo okresowości

właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków ułożonych według wzrastających mas atomowych zmieniają się w sposób okresowy

Dmítrij Mendelejew

tablica Mendelejewa 1871

układ krótki
grupy główne + poboczne

11

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH

Blok s	Blok d										Blok p						18	
1 1 H																	2 He	
2 3 Li 4 Be																	10 Ne	
3 11 Na 12 Mg																	18 Ar	
4 19 K 20 Ca	38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd	50 Sn 51 In 52 Cd	62 Hg 63 Tl 64 Pb	80 Hg 81 Tl 82 Pb	84 Po 85 At 86 Rn	86 Rn	88 Ra 89 Ac	102 Hg 103 Tl 104 Pb	118 Xg	119 Yb 120 Lu	122 Hg 123 Tl 124 Pb	136 Xe 137 I 138 Te	154 Xe 155 I 156 Te	172 Xe 173 I 174 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te
5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd	50 Sn 51 In 52 Cd	62 Hg 63 Tl 64 Pb	80 Hg 81 Tl 82 Pb	84 Po 85 At 86 Rn	86 Rn	88 Ra 89 Ac	102 Hg 103 Tl 104 Pb	118 Xg	119 Yb 120 Lu	122 Hg 123 Tl 124 Pb	136 Xe 137 I 138 Te	154 Xe 155 I 156 Te	172 Xe 173 I 174 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te
6 55 Cs 56 Ba	72 Hf 73 Ta 74 W 75 Re 76 Os 77 Ir 78 Pt	80 Hg 81 Tl 82 Pb	84 Po 85 At 86 Rn	86 Rn	88 Ra 89 Ac	102 Hg 103 Tl 104 Pb	118 Xg	119 Yb 120 Lu	122 Hg 123 Tl 124 Pb	136 Xe 137 I 138 Te	154 Xe 155 I 156 Te	172 Xe 173 I 174 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te
7 87 Fr 88 Ra	104 Rf 105 Db 106 Sg 107 Bh 108 Hs 109 Mt	112 Hg 113 Tl 114 Pb	120 Hg 121 Tl 122 Pb	136 Xe 137 I 138 Te	154 Xe 155 I 156 Te	172 Xe 173 I 174 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te	186 Xe 187 I 188 Te

tablica Alfreda Wernera 1905 roku - długa forma układu okresowego

12

13

Układ Okresowy Pierwiastków 1.0 STANDARD

Au Złoto

Stan skupienia: Ciepło Stałe
 Liczba atomowa: 79
 Masa atomowa [u]: 196,96654
 Charakter tlenku: anfolityczny
 Elektryczność: 2,4
 Gęstość: 19,28
 Rok odkrycia: staroż.
 Promień atomu: 144
 Temperatura topnienia: 1064 C
 Temperatura wrzenia: 2800 C

UOP 1.0 STANDARD

17 18

1 H He
 2 Li Be
 3 Na Mg
 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
 6 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
 7 Fr Ra Ac Rf Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

Lantanowce
 Aktywność

Grzegorz Łaba 1998 Wtorek 98-12-08 13:41:44

Układ Okresowy Pierwiastków 1.0 STANDARD

Układ Okresowy Pierwiastków

Podstawowe Budowa atomu Wł. makroskopowe Wł. chemiczne Wł. fazowe Wł. cieplne Wł. elek.

Symbol: **Rn** Nazwa polska: **Radon** Liczba atomowa: **86**
 Nazwa angielska: **Radon** Masa atomowa [u]: **220,018**
 Stan skupienia: gazowy Rok odkrycia: **1910**
 Nazwa łacińska: **Radon**

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
 Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

19:14:34
 15 listopada 1998, Niedziela

17

Liczba atomowa

Symbol chemiczny

Stopnie utlenienia

Struktura elektronowa

Względna masa atomowa

Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia

Elektryczność

16

32,066

112,8

444,67

2,4

-2; 2; 4; 6

Ne 3s²3p⁴

16

Cząsteczka

Każdy elektrycznie obojętny zespół atomów powiązanych ze sobą tak mocno, że może istnieć samodzielnie .

Cząsteczka stanowi najmniejszą ilość związku chemicznego, jaka może uczestniczyć w reakcjach chemicznych.

W postaci cząsteczek występują związki chemiczne, a także i niektóre pierwiastki chemiczne, np. azot, chlor czy tlen. (N₂; Cl₂; O₂)



Liczba Avogadro

Wielkość ta podaje liczbę cząsteczek lub atomów zawartych w jednym molu substancji.

$$N = 6,022045 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$



Masa atomowa i cząsteczkowa

Jest to masa jednego atomu lub cząsteczki.
Rozróżniamy masę atomową (cząsteczkową) bezwzględną, wyrażoną w jednostkach wagowych (np. gramach) oraz masę atomową (cząsteczkową) względną wyrażającą stosunek bezwzględnej masy atomu (cząsteczki) do masy określonego wzorca.
Przyjętym wzorcem jest 1/12 masy atomu izotopu węgla ^{12}C (jednostka masy atomowej - oznaczana j.m.a lub u - $1,6605 \cdot 10^{-24}\text{g}$), a względną masę atomową wyrażamy liczbą bezwymiarową.




Mol

Jednostka miary liczności materii, która zawiera liczbę cząstek (atomów, cząsteczek, jonów, elektronów lub innych) równą liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg czystego nuklidu ^{12}C .

W przypadku gazów mol każdego gazu, pod jednakowym ciśnieniem i w jednakowej temperaturze, zajmuje taką samą objętość.


W warunkach normalnych ($t=273,15\text{ K}$;
 $p=1,01325 \cdot 10^5\text{ N/m}^2$) objętość ta wynosi

22,415 dm³



Masa molowa

Masa jednego mola danych cząstek materii wyrażona w $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ równa liczbowo względnej masie atomowej lub cząsteczkowej.



Gramorównoważnik

Ilość gramów substancji równoważna przyjętemu wzorcowi.

W przypadku reakcji typu kwas-zasada, gramorównoważnik stanowi liczbę gramów substancji oddającą lub przyłączającą 1 mol jonów wodoru (lub jonów wodorotlenowych)

W reakcjach redukcji-utleniania (redoks) gramorównoważnik obejmuje liczbę gramów substancji odpowiadającą 1/n mola tej substancji, gdzie „n” jest liczbą elektronów oddawanych lub przyłączanych przez tę substancję



ZASADY NAZEWNICTWA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

nazwy pierwiastków

nazwy tlenków

nazwy wodorotlenków, kwasów i soli
wzory sumaryczne i strukturalne

substancje nieorganiczne ogólnie dzielimy na następujące grupy:

pierwiastki,
tlenki, wodoroki,
wodorotlenki,
kwasy
sole

23

pierwiastki

pierwiastki o charakterze czysto **metalicznym**
w grupach 1-13 układu okresowego

tworzenie jonów dodatnich – Me^{x+}

pierwiastki o charakterze **niemetalicznym**
należą do nich gazy szlachetne, fluorowce, tlenowce, część azotowców i tlenowców

tworzenie jonów ujemnych – X^{x-}

wyróżnia się również pierwiastki **półmetaliczne**
w środkowej części układu okresowego np. bor,
krzem, german, arsen,

24

tlenki


CuO tlenek miedzi(II)
SO₃ tlenek siarki(VI) lub trójtlenek siarki

połączenia różnych pierwiastków z tlenem




metody otrzymywania


bezpośrednia reakcja z tlenem




utlenianie tlenków



redukcja tlenków




termiczny rozkład soli lub wodorotlenków



25


wodorki

dwuskładnikowe związki pierwiastków z wodorem




otrzymywanie wodoroków

w bezpośredniej reakcji pierwiastka z wodorem np.



podział wodoroków


wodorki metali



wodorki niemetalu CH₄, NH₃ (amoniak)

26


wodorotlenki




otrzymywanie

wodorotlenki litowców i berylowców otrzymuje się 2 metodami:


1. reakcja tlenku z wodą



2. reakcja metalu z wodą



inne wodorotlenki otrzymuje się z soli danego metalu i wodorotlenku o silnych właściwościach zasadowych




wodorotlenek miedzi(II)


27

właściwości chemiczne wodorotlenków

wodorotlenki **zasadowe** reagują z kwasami,
a nie reagują z zasadami



wodorotlenki **amfoteryczne** reagują z kwasami i z zasadami



28

kwasy nieorganiczne



KWASY
NIEORGANICZNE

BEZTLENOWE
kwas chlorowodorowy HCl

TLENOWE
kwas azotowy(V) HNO₃

29

Ważniejsze kwasy w chemii nieorganicznej

H₂SO₃ kwas siarkowy(IV) (kwas siarkawy) – siarczan(IV)

H₂SO₄ kwas siarkowy(VI) (kwas siarkowy) – siarczan(VI)

H₂CO₃ kwas węglowy -węglan

H₃PO₃ kwas fosforowy(III) (kwas fosforawy) – fosforan(III)

H₃PO₄ kwas fosforowy(V) (kwas ortofosforowy) - fosforan(V)

H₄P₂O₇ kwas difosforowy(V) (kwas pirofosforowy) -difosforan(V)

HNO₂ kwas azotowy(III) (kwas azotawy) – azotan(III)

HNO₃ kwas azotowy(V) (kwas azotowy) – azotan(V)

HClO kwas chlorowy(I) (kwas podchlorawy) – chloran(I)

HClO₂ kwas chlorowy(III) (kwas chlorawy) – chloran(III)

HClO₃ kwas chlorowy(V) (kwas chlorowy) – chloran(V)

HClO₄ kwas chlorowy(VII) (kwas nadchlorowy) – chloran(VII)


30

HCl kwas chlorowodorowy (solny) - **chlorek**

H₂S kwas siarkowodorowy (siarkowodor) - **siarczek**

otrzymywanie kwasów


reakcja bezwodnika z wodą



kwasy, których bezwodniki nie reagują z wodą otrzymuje się w reakcji jego rozpuszczalnej soli z mocnym kwasem



kwasy beztlenowe, które nie posiadają bezwodników otrzymuje się przez rozpuszczenie w wodzie odpowiedniego wodoru



31

wzory chemiczne sumaryczne i strukturalne

symbole jonów oznacza się poprzez **symbol pierwiastka** lub grupy z dodanym w górnym indeksie znaku (+) (**kation**) i (-) (**anion**) znak (+) i (-) jednostkowy ładunek elektryczny.

np: **Na⁺** - kation sodu

gdy jon posiada wielokrotność tego ładunku dodaje się jeszcze liczbę oznaczającą tę wielokrotność np:

Ca²⁺ - kation wapnia

gdy ładunek jest **zdelokalizowany** w obrębie całej grupy,

np: **SO₄²⁻** - anion siarczanowy(VI)

rodniki oznacza się, poprzez dodanie **małej kropki** z prawej strony symbolu pierwiastka lub grupy


np: **O[•]** - rodnik tlenowy

32

charakterystyka soli


sole obojętne

zastąpienie wszystkich wodorów kwasowych atomami metalu




wodorosole

niecałkowite zastąpienie wodorów kwasowych w cząsteczkach kwasów wieloprotonowych



hydroksosole



kwasy jednoprotone i zasady jednowodorotlenowe nie tworzą wodorosoli ani hydrosoli.

sole uwodnione




33

sole




metody otrzymywania soli


zasada + kwas → sól + woda



tlenek zasadowy + kwas → sól + woda



tlenek kwasowy + zasada → sól + woda





tlenek zasadowy + tlenek kwasowy → sól




34

właściwości chemiczne kwasów



kwasy reagują z zasadami (reakcja zobojętnienia)





kwasy reagują z wieloma metalami



reagują z tlenkami zasadowymi i amfoterycznymi



reagują z niektórymi solami



35

wzory chemiczne

to skrótowy zapis składu atomowego cząsteczek

wzory sumaryczne proste, w których podaje się prostą listę atomów wchodzących w skład danego związku wraz z ich krotnościami (np. **H₂SO₄**)


wzory sumaryczne rozbudowane, uwzględniające elementy faktycznej struktury związku, które mogą mniej lub bardziej dokładnie "rozpisywać" strukturę związku np: **CH₃CH₂OH = C₂H₅OH** (etanol)

wzory strukturalne - które przyjmują formę rysunku, gdzie zwykle pokazuje się jak i jakimi wiązaniami są połączone wszystkie atomy w cząsteczce

36

jakie pierwiastki i ile połączonych atomów

symbole chemiczne wodoru i tlenu




wzór chemiczny wody

indeks = 1

indeksy stechiometryczne

jakie pierwiastki i ile połączonych atomów


symbole chemiczne fosforu i tlenu








wzór chemiczny

indeksy stechiometryczne

pary elektronowe - kreski - klasyczne wzory strukturalne cząsteczek








wzór strukturalny podaje sposób wzajemnego powiązania atomów w cząsteczce związku chemicznego




modele podstawowych kwasów





wzór elektronowy HNO_3



kwas chlorowodorowy - HCl - kwas solny

kwas siarkowodorowy - H_2S niebezpieczny dla zdrowia





Najczęściej występujące w wodzie aniony:
 CO_3^{2-} , HCO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-} , NO_2^- , NO_3^- , PO_4^{3-}

Najczęściej występujące w wodzie kationy:
 Ca^{+2} , Mg^{+2} , Na^+ , K^+ , Fe^{+2} , Fe^{+3} , Mn^{+2} , NH_4^+

47

**Podstawy obliczeń chemicznych
(stechiometrycznych)**



48

Prawo zachowania masy (materii)

We wszystkich reakcjach chemicznych suma mas produktów równa się sumie mas substratów.


W reakcjach chemicznych zachodzących z wydzielaniem nawet dużych ilości energii (np. detonacje) przemiana masy w energię jest znikoma.

W reakcjach jądrowych słuszne jest prawo zachowania materii wynikające z równoważności masy i energii

$$E=mc^2$$



49




Masy atomowe

Fe – 56

O – 16

Masa cząsteczkowa: $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 2 \cdot 56 + 3 \cdot 16 = 160$




50

Prawo stosunków stałych

Każdy związek chemiczny ma stały i charakterystyczny skład ilościowy.

Skład jakościowy i ilościowy danego związku chemicznego określa jednoznacznie jego wzór chemiczny.



51



Masy atomowe

Mg – 24

S – 32

O – 16

Masa cząsteczkowa $\text{MgSO}_4 = 24 + 32 + 4 \cdot 16 = 120$

Masa molowa $\text{MgSO}_4 = 120 \text{ g/mol}$

1 mol MgSO_4 zawiera 24g Mg, 32g S i 64g O
czyli

20% Mg, 26,7% S i 53,3% O



52

Obliczenia stechiometryczne


Obliczenia oparte na wzajemnym stosunku ilościowym składników w poszczególnych związkach chemicznych oraz obliczenia wykorzystujące stosunki wagowe między substancjami reagującymi i produktami reakcji, np.:

- określenie wzoru chemicznego substancji na podstawie wyników analizy ilościowej
- obliczanie składu procentowego związku na podstawie wzoru chemicznego
- obliczanie ilości reagujących substancji na podstawie równań chemicznych



53

Obliczanie składu procentowego związku na podstawie wzoru chemicznego



1 mol tego związku zawiera:

56 g Fe, 32 g S, 14g H i 176 g O (Σ 278 g)

lub

56 g Fe, 32 g S, 64 g O i 126g H_2O (Σ 278 g)

100g $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ zawiera

20,14g Fe, 11,51g S, 5,04g H i 63,31g O


lub

20,14g Fe, 11,51g S, 23,02g O i 45,33g H_2O



54

Skład procentowy (procenty wagowe)



jest następujący:

Fe – 20,14 %

S – 11,51%

O – 63,31 %

H – 5,04 %

lub

Fe – 20,14 %

S – 11,51%

O – 23,02 %

H₂O – 45,33 %



55

Określenie wzoru chemicznego substancji na podstawie wyników analizy ilościowej

Analiza ilościowa uwodnionej soli (skład w procentach wagowych):

Mg – 11,88 %

Cl – 34,65 %

H – 5,94 %

O – 47,53 %

Masy atomowe

Mg – 24; Cl – 35; H – 1; O – 16



56

Podane wartości składu procentowego oznaczają zawartości poszczególnych składników w 100 gramach związku.

Uwzględniając masy atomowe poszczególnych pierwiastków można określić w jakich proporcjach atomowych występują one w analizowanym związku:

$$\text{Mg} - 11,88/24 = 0,495$$

$$\text{Cl} - 34,65/35 = 0,99$$

$$\text{H} - 5,94/1 = 5,94$$

$$\text{O} - 47,53/16 = 2,97$$



57

Sprowadzając uzyskane proporcje do liczb całkowitych otrzymujemy:

$$\text{Mg} - 0,495/0,495 = 1$$

$$\text{Cl} - 0,99/0,495 = 2$$


$$\text{H} - 5,94/0,495 = 12$$

$$\text{O} - 2,97/0,495 = 6$$



58

Obliczanie ilości reagujących substancji na podstawie równań chemicznych



Masy atomowe

Fe – 56

O – 16


Masa cząsteczkowa: $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 2 \cdot 56 + 3 \cdot 16 = 160$

Z zapisu reakcji wynika zależność, że 224 g Fe reaguje z 96 g O dając w efekcie 320 g Fe_2O_3

Na podstawie tej informacji można, mając podaną ilość jednego z reagentów, obliczyć ilość pozostałych reagentów (substratów i produktów) biorących udział w reakcji



59



$$\frac{224}{x} = \frac{96}{y} = \frac{320}{z}$$

x – ilość żelaza

y – ilość tlenu

z – ilość tlenku żelaza(III)

$$y = 6[\text{g}]$$

$$\frac{224}{x} = \frac{96}{6}$$

$$x = 14[\text{g}]$$


$$\frac{96}{6} = \frac{320}{z}$$

$$z = 20[\text{g}]$$





60

Wytwarzany jako odpad, w technologii produkcji bieli tytanowej, siarczan(VI) żelaza(II) wykorzystywany jest, między innymi, do chemicznego usuwania fosforu ze ścieków. Produkcja 1 tony bieli tytanowej z ilmenitu dostarcza ilości siarczanu(VI) żelaza(II) wystarczającej do usunięcia ok. 750 kg fosforanów.




61

Biel tytanowa – TiO_2
Siarczan(VI) żelaza(II) – FeSO_4
Ilmenit – FeTiO_3




Masy atomowe:
Ti – 48; Fe – 56; O – 16; P – 31; S – 32

62



$$x = 152/80 = 1,9 \text{ t}$$



$$y = 1,9 * 180 / 456 = 0,75 \text{ t} = 750 \text{ kg}$$

63

Stężenie

Ilość substancji zawartej w określonej ilości rozpuszczalnika lub roztworu określa stężenie roztworu.

W zależności od tego, w jaki sposób wyrażane są ilości substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika (masa lub objętość) stężenie definiuje się w różny sposób:

- stężenie wagowo-wagowe
- stężenie wagowo-objętościowe
- stężenie objętościowo-objętościowe



64

Najczęściej stosowane jednostki stężeń

stężenie procentowe wagowe:

liczba jednostek wagowych substancji w 100 jednostkach wagowych roztworu, przy roztworach o gęstości 1 g/cm^3 odpowiada ono ilości jednostek wagowych substancji w 100 jednostkach objętościowych roztworu

parts per milion (ppm)

określa liczbę wagowych substancji w jednym milionie jednostek wagowych roztworu, jest ono równoważne liczbie miligramów substancji w jednym kilogramie roztworu, przy roztworach o gęstości 1 g/cm^3 odpowiada ono mg/dm^3

65

$$1 \text{ mg/dm}^3 = 1 \text{ ppm}$$


$$1 \text{ } \mu\text{g/dm}^3 = 1 \text{ ppb}$$

$$1 \text{ ng/dm}^3 = 1 \text{ ppt}$$

$$1 \text{ pg/dm}^3 = 1 \text{ ppq}$$

(równości powyższe zachowane są dla roztworów wodnych o gęstości 1 kg/dm^3)

$$1 \text{ ppm} = 1\,000 \text{ ppb} = 1\,000\,000 \text{ ppt} = 1\,000\,000\,000 \text{ ppq}$$



66

- ❖ 1 ppm - 4 krople oznaczanej substancji w 200 litrowej beczce

- ❖ 1 ppb - 1 kropla oznaczanej substancji w cysternie samochodowej

- ❖ 1 ppt - 1 kropla oznaczanej substancji w 1 000 cysternach samochodowych

- ❖ 1 ppq - 1 kropla oznaczanej substancji w słupie wody o podstawie boiska piłkarskiego i wysokości 10 km

67



Stężenie molowe:

Ilość moli substancji zawartej w 1 dm³ roztworu, oznaczane często „m”



68

Gramorównoważnik

Ilość gramów substancji równoważna przyjętemu wzorcowi.

W przypadku reakcji typu kwas-zasada, gramorównoważnik stanowi liczbę gramów substancji oddającą lub przyłączającą 1 mol jonów wodoru (lub jonów wodorotlenowych)

W reakcjach redukcji-utleniania (redoks) gramorównoważnik obejmuje liczbę gramów substancji odpowiadającą 1/n mola tej substancji, gdzie „n” jest liczbą elektronów oddawanych lub przyłączanych przez tę substancję



69

Stężenie normalne:

Ilość gramorównoważników substancji zawartej w 1 dm³ roztworu, oznaczane często „n”

70

Jakie jest stężenie procentowe 0,1 n roztworu H₂SO₄ ?



Jaka jest wartość tego stężenia wyrażona w ppm?

71

